

Tema: Relevancia y valoración de la disfunción cardiaca en la cirrosis.

Dr. Rafael Bañares

Puntos Clave

- La miocardiopatía del cirrótico es una entidad pobremente definida en la que se ha sugerido la presencia de una disfunción diastólica en reposo y una disfunción sistólica desencadenada por el estrés físico o farmacológico.
- Se observan datos de cardiopatía en la mitad de los pacientes cirróticos.
- La cardiopatía del cirrótico es independiente de la etiología de la cirrosis.
- La valoración de la función cardiaca es altamente dependiente de las condiciones de precarga y postcarga por lo que las técnicas convencionales no son excelentes para la valoración de la función cardiaca en la cirrosis. El uso de Doppler tisular es preferible debido a que su medida es menos dependiente de las condiciones de carga.
- Es frecuente la existencia de alteraciones electrofisiológicas, reflejadas en un alargamiento del intervalo QT.
- El trasplante hepático puede revertir la miocardiopatía del cirrótico medio o largo plazo. Sin embargo, la presencia de miocardiopatía cirrótica comporta un riesgo adicional de insuficiencia cardiaca en el curso de la intervención y postoperatorio inmediato.
- El manejo óptimo específico de esta entidad se desconoce y se aplica el tratamiento general de la insuficiencia cardiaca con algunas limitaciones.