

## Hepatitis en la edad pediátrica

Dra. Cristina Molera

### Puntos Clave

- El principal agente etiológico sospechoso del brote de hepatitis aguda de 2022 es un Adenovirus. Estudio de casos-controles determinaron que los casos tenían mayor probabilidad de infección por adenovirus
- Los estudios hasta ahora presentan muchas limitaciones, empezando por la definición de caso, diferente en muchos países.
- La evolución clínica de la mayoría de los pacientes es favorable.
- Hoy en día, la transmisión vertical de madre a hijo es la principal vía de adquisición del VHC en la infancia (99%).
- Puede existir en un 20% de los casos un aclaramiento espontáneo de la infección, siendo rara la eliminación pasados tres años. El 80% restante desarrollará infección crónica que persistirá en la edad adulta.
- A pesar de disponer de vacuna eficaz desde los 80, una proporción no despreciable de niños contrae la infección VHB por transmisión madre-hijo.
- La prevalencia más elevada corresponde a niños procedentes de Asia, África y algunos países de Europa Oriental.
- La transmisión vertical puede ocurrir durante la gestación.
- La evolución hacia la cronicidad es mucho más frecuente en los niños infectados por transmisión vertical o durante los primeros meses de vida (90%), frente al 5% de los que adquirieron la infección a mayor edad.

ORGANIZA: